



NOTE D'INFORMATION

DETECTION FOC TR4 EN EQUATEUR

CODE :

NI_IT2_2025_PIC_CERCOTROP

Version : 1

Date : 24/09/2025

Page(s) : 1

Rédactrice : Coralie JULAN



Photo 1 : Symptôme de Fusarium TR4 vue de l'extérieur (jupe de feuilles jaunies)



Photo 2 : Symptôme de Fusarium TR4 vue de l'intérieur (nécrose)

La fusariose du bananier est causée par le champignon Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc). Très résistant, il survit plusieurs dizaines d'années dans le sol et bloque la circulation de la sève, entraînant la mort de la plante. Aucun traitement n'existe : une parcelle contaminée reste inutilisable pendant de longues années.

Nouvelle annonce officielle :

La fusariose TR4 a été confirmée pour la première fois en Équateur, malgré sa présence déjà connue dans les pays voisins (Colombie et Pérou).

Cette détection illustre la propagation continue de la maladie sur le continent, rappelant que la TR4 peut se déplacer rapidement via les plants infectés ou de terre contaminée transportée sur les chaussures, engins agricoles, conteneurs...

Elle renforce l'importance de rester vigilant et de respecter strictement les mesures de prévention pour limiter toute introduction dans les parcelles.

Deux consignes importantes : 1) Si vous voyagez dans une zone où la TR4 est présente, ne ramenez pas vos chaussures et lavez votre linge à 90 °C. 2) Signalez immédiatement aux groupements tout bananier suspect sur votre exploitation ou dans une zone non cultivée.

Des groupes de travail avec les services de l'état, les groupements, la CMA-CGM et l'ensemble de la filière sont mobilisés pour prévenir l'arrivée et la propagation de la maladie. Nous vous tiendrons rapidement informés des mesures mises en œuvre par les différentes parties intéressées.

La vigilance doit être renforcée avec tous les pays d'Amérique Latine, les visites, les échanges, l'arrivée des nouveaux salariés.....